

۱. رایج ترین شکل مصرف دارو کدام است: (B متوسط)
- الف - قرص ب - آمپول ج - کپسول د - پماد
۲. قرصهای دارای پوشش روده‌ای Enteric coated (E.C.) Tab دارای چه خصوصیتی می باشند: (A سخت)
- الف) در pH اسیدی نامحلول و در پ-هاش قلیایی محلول هستند
 ب) در pH قلیایی نامحلول و در پ-هاش اسیدی محلول هستند
 ج) فقط در pH اسیدی محلول هستند.
 د) pH تاثیری بر حلالیت قرص ندارد.
۳. کدامیک از قرصهای زیر جویدنی است: (C آسان)
- الف - دایمتیکون ب - پروپرانولول ج - ایبوپروفن د - ایزوسورباید
۴. کدام داروی زیر برای جلوگیری از لخته شدن خون استفاده می شود؟ (B متوسط)
- الف) استامینوفن ب) یکلوفاک ج) آسپرین د) سیکلوسپورین
۵. فرق الگزییر با شربت در چیست: (C آسان)
- الف - الگزییرها در مقایسه با شربت‌ها دارای شیرینی کمتر و چگالی بیشتری دارند.
 ب - الگزییرها در مقایسه با شربت‌ها دارای شیرینی و چگالی بیشتری دارند.
 ج - الگزییرها در مقایسه با شربت‌ها دارای شیرینی و چگالی کمتری دارند.
 د - الگزییرها در مقایسه با شربت‌ها دارای شیرینی بیشتر و چگالی کمتری دارند.
۶. کدام داروی آنتی موسکارینی در درمان بیماریهای معده (اسید - پپسین) استفاده می شود: (A سخت)
- الف - هیوسین ب - آتروپین ج - پیرنزیپین د - اکسی بوتینین
۷. کدام یک از موارد زیر از عوارض دارو های آنتی موسکارینی نمی باشد: (B متوسط)
- الف - هایپرترمی ب - میوز ج - خشکی دهان د - یبوست

۸. سردرد جلوی پیشانی از شایع ترین عوارض جانبی کدام داروی ضد درد و ضد تب و ضد التهاب است؟ (A سخت)

الف) دیکلوفناک (ب) ایندومتاسین (ج) پیروکسیکام (د) استامینوفن

۹. کدام داروی زیر، شل کننده عضلانی است: (A سخت)

الف - استامینوفن (ب) - باکلوفن (ج) - مترونیدازول (د) - بتانکول

۱۰. کدام یک از داروهای زیر در درمان حملات آسم (درمان فوری) استفاده می شود: (B متوسط)

الف - سالبوتامول (ب) - آتروونت (ج) - سالمترول (د) - متاپروترونول

۱۱. کدامیک از موارد زیر جویدنی نیست؟ (B متوسط)

الف - مبندازول (ب) - دایمتیکون (ج) - قرص های ضد اسید (د) - دایجستيو

۱۲. سردرد جلوی پیشانی از شایع ترین عوارض جانبی کدام داروی ضد درد و ضد تب و ضد التهاب است: (A سخت)

الف - دیکلوفناک (ب) - ایندومتاسین (ج) - پیروکسیکام (د) - استامینوفن

۱۳. از مزایای قرص های با پوشش قندی به حساب نمی آید: (A سخت)

الف) پوشاندن طعم و بوی دارو (ب) محافظت در برابر نور (ج). جذب سریع (د). ظاهر زیبا

۱۴. درازة به این قرص ها گفته می شود: (C آسان)

الف). EC (ب) SC (ج) SR (د) FC

۱۵. به عنوان محرک اشتها می تواند عمل کند اما مصرف آن در کودکان احتمال کاهش حافظه را در بر دارد؟ (B متوسط)

الف) هیدروکسی زین (ب) سیتیزین (ج) سیپروهپتادین (د) سیناریزین

۱۶. کدام یک از منابع زیر کمترین مقدار آهن را نسبت به بقیه دارد؟ (B متوسط)

الف) گوشت قرمز (ب) مرغ (ج) پسته (د) ماهی

۱۷. کدام یک از ویتامین های محلول در چربی نیست؟ (A سخت)

D (د)

K (ج)

(ب) فولیک اسید

A (الف)

۱۸. کدامیک در درمان ناباروری زنان و مردان به عنوان محرک رایج جهت تخمک گذاری به کار می رود؟ (A سخت)

(د) کلومیفن

(ج) بروفن

(ب) رالوکسی فن

(الف) تاموکسیفن

۱۹. با مصرف این دارو احتمال دوقلو زایی افزایش می یابد: (A سخت)

(د) کلومیفن

(ج) بروفن

(ب) رالوکسیفن

(الف) تاموکسیفن

۲۰. در شب ادراری کودکان بزرگتر از ۶ سال کاربرد دارد: (B متوسط)

(د) آمی تریپتیلین

(ج) نورتریپتیلین

(ب) دزی پرامین

(الف) ایمی پرامین

۲۱. گفته می شود که علاوه بر افسردگی و پروفیلاکسی دردهای میگرنی در دندان درد هم موثر است؟ (C آسان)

(د) آمی تریپتیلین

(ج) نورتریپتیلین

(ب) دزی پرامین

(الف) ایمی پرامین

۲۲. در دسته داروهای ضد افسردگی TCA مهمترین دارو در درمان وسواس شمرده می شود: (A سخت)

(د) دزی پرامین

(ج) تریمی پرامین

(ب) کلومی پرامین

(الف) ایمی پرامین

۲۳. کدام دارو ضد اسهال اپیوئیدی می باشد؟ (B متوسط)

(د) گریپ میکسچر

(ج) بیزاکودیل

(ب) پلانناژل

(الف) دیفنوکسیلات

۲۴. دستور مصرف کدام دارو به صورت "صبح ها ناشتا" می باشد؟ (A سخت)

(د) هیوسین

(ج) امپرازول

(ب) رانیتیدین

(الف) کلیدینیوم

۲۵. قرصهای روده ای در کدام قسمت دستگاه گوارش باز می شوند؟ (C آسان)

د - مری

ج - روده بزرگ

ب - روده کوچک

الف - معده

۲۶. مصرف کدامیک از دسته های داروئی زیر باعث وابستگی نمی شود: (B متوسط)

(الف) مخدر ها (ب) بنزو دیازپین ها (ج) ضد افسردگی ها (د) همه موارد باعث وابستگی می شوند

۲۷. از اشکال کدام دارو 40mg | tab و 10mg | Ap می باشد؟ (A سخت)

الف) lasix (ب) spirenolactone (ج) Manithol (د) HCTZ

۲۸. از عوارض کدام داروی قلبی - عروقی زیر ژینوکوماستی و صدای زنانه در آقایان می باشد؟ (A سخت)

الف) Aldacton (ب) HCTZ (ج) Eplerenone (د) Lasix

۲۹. Adalat نام تجاری کدام دارو می باشد؟ (B متوسط)

الف) Nicardipine (ب) Amilodipine (ج) Nifidipine (د) Nimodipine

۳۰. از داروهای جلوگیری کننده از به هم چسبیدن پلاکت ها نمی باشد؟ (A سخت)

الف) Dipirdamol (ب) Clopidogrel (ج) Atenolol (د) ASA

۳۱. از عوارض کدام دارو احتمال سرفه های خشک و حساسیت به نور می باشد؟ (B متوسط)

الف) rerapamil (ب) captopril (ج) losartan (د) Diltiazem

۳۲. کدامیک جزو کاربردهای درمانی استروژن محسوب نمی شود؟ (A سخت)

الف- درمان به صورت جایگزینی هورمون ب- ضد بارداری ج- سردردهای میگرنی د- قاعدگی دردناک

۳۳. علاوه بر افسردگی در قطع مصرف سیگار مطرح است و از کاربردهای تایید نشده و در عین حال رایج آن می توان به

کاهش وزن و اختلالات بیش فعالی اشاره کرد: (A سخت)

الف- بوپروپیون ب- بونلافاکسین ج- ترازودن د- متیل فنیدیت

۳۴. به دلیل افزایش تمرکز و ایجاد بی خوابی به داروی دوپینگ امتحان معروف است اما به دلیل عوارض بالایی که دارد

نه تنها توصیه نمی شود بلکه باید به شدت از دادن آن بدون نسخه ی پزشک خودداری کرد: (C آسان)

الف- بوپروپیون ب- ونلافاکسین ج- ترازودن د- متیل فنیدیت (ریتالین)

۳۵. منظور از رعایت قانون I درچیدن داروها در فضای انبار چیست: (A سخت)

الف- کالای با تاریخ نزدیک، خروج زودتر کالا ب- کالای با تاریخ دورتر، خروج زودتر کالا

ج- کالای با تاریخ نزدیک، خروج دیرتر کالا
د- کالای با تاریخ دیرتر، خروج دیرتر کالا

۳۶. قرص بیزاکودیل دارای چه نوع پوششی است: (B متوسط)

الف- پلیمری ب- قندی ج- روکش ندارد د- پوشش روده ای

۳۷. کدام از مزایای داروهای زیر زبانی نمی باشد: (A سخت)

الف- جذب سریعتر ب- جذب کاملتر
ج- ورود مستقیم دارو به جریان خون د- قرار گرفتن تحت متابولیسم کبدی

۳۸. در مورد قرصهای جوشان کدام مورد صحیح نمی باشد: (C آسان)

الف- آزاد کردن CO₂ در هنگام مجاورت با آب
ب- آزاد کردن CO₂ در هنگام مجاورت با آب که باعث متلاشی شدن آنها می گردد.
ج- آزاد کردن CO₂ در هنگام مجاورت با آب که باعث پوشاندن مزه نامطلوب این قرصها می گردد
د- آزاد کردن CO₂ در هنگام مجاورت با آب که باعث فعال شدن ماده موثره این قرصها می گردد

۳۹. محلول خوراکی آلومینیوم ام جی اس به کدام شکل در بازار موجود است: (B متوسط)

الف- شربت ب- الکزیر ج- سوسپانسیون د- ساشه

۴۰. کدامیک از ملین ها در حاملگی منع مصرف ندارد: (A سخت)

الف- سی لاکس ب- منیزیم هیدروکساید ج- روغن کرچک د- لاکتولوز

۴۱. کدام داروی زیر به دلیل نفوذ به سیستم اعصاب مرکزی، مورد سوئی مصرف (توسط معتادان) قرار می گیرد: (B متوسط)

الف- لوپرامید ب- دیفنوکسیلات ج- پسیلیوم د- بلادونای بی

۴۲. از کدام دارو برای برای سرکوب زایمان زودرس استفاده می شود: (C آسان)

الف- ریتودرین ب- کلوبوتینول ج- متورال د- سایمتیدین

۴۳. کدام داروی زیر در درمان گلوکوم استفاده نم شود: (A سخت)

الف - دوزولامید ب - بتاکسولول ج - تیمولول د - بتامتازون

۴۴. اصلی ترین ویژگی یک فرآورده چشمی چیست؟ (C آسان)

الف - استریل بودن ب - آپروژن بودن ج - نگهداری در یخچال د - هیچکدام

۴۵. کدام مورد از توصیه های لازم برای افراد با مشکلات گوارش نمی باشد؟ (B متوسط)

الف) تعداد وعده های غذایی بیشتر با مقدار غذای کمتر ب) عدم دراز کشیدن بلافاصله بعد از غذا
ج) خوردن غذاهای حاوی کافئین د) عدم مصرف سیگار

۴۶. از عوارض کدام دارو "حرکات ناموزون دست و چشم و فلج در اطفال" (عوارض اکستراپیرامیدال) می باشد؟

(A سخت)

الف - رانیتیدین ب - فیژان ج - متوکلوپرامید د - لوپرامید

۴۷. "قهوه ای شدن رنگ دندان ها" از عوارض کدام دسته از آنتی بیوتیکها می باشد؟ (A سخت)

الف - پنی سیلین ها ب - آمینوگلیکوزیدها ج - ماکرولیدها د - تتراسیکلین ها

۴۸. تفاوت پنی سیلین وی و پنی سیلین جی چیست؟ (B متوسط)

الف - تفاوتی ندارند ب - تفاوت آنها در دوام اثر آنهاست

ج - اولی خوراکی و دومی تزریقی است د - حلالیت متفاوت دارند

۴۹. کدامیک بصورت پماد استریل چشمی می باشد؟ (C آسان)

الف - بتامتازون ب - تتراسیکلین ج - اریترومايسين د - همه موارد

۵۰. اصلی ترین کاربرد آسپیرین چیست؟ (A سخت)

الف - ضد درد ب - ضد تب ج - ضد پلاکت د - ضد التهاب

۵۱. آویشن شیرازی در چه نوع فرآورده هایی بکار می رود؟ (B متوسط)

الف - ضد سرفه ب - ضد فشار ج - ضد چربی د - ضد باکتری

۵۲. کدام دارو از خانواده ویتامینهای B بوده و اثر ضد چربی دارد؟ (A سخت)

الف - نیکوتینیک اسید ب - جمفیروزیل ج - کلوفیرات د - سیمواستاتین

۵۳. اثر ضد تهوع ویتامین B6 در چه مواردی کاربرد دارد؟ (B متوسط)

الف - مسمومیت غذایی ب - مسمومیت باگاز منوکسید کربن ج - بارداری د - موارد ب و ج

۵۴. بهترین زمان مصرف قرص فروس سولفات: (A سخت)

الف - یکساعت قبل یا دو ساعت پس از غذا ب - صبح ناشتا
ج - در صورت بروز ناراحتی گوارشی پس از شام د - موارد الف و ج

۵۵. در کدام دارو ماده پزودو افرین بکاررفته است: (B متوسط)

الف - شربت دکسترومتوفان پی ب - قرص سرماخوردگی بزگسالان
ج - موارد الف و ب د - هیچکدام

۵۶. کدام داروی زیر، شل کننده عضلانی است؟ (C آسان)

الف) استامینوفن ب) باکلوفن ج) مترونیدازول د) بتانکول

۵۷. کدامیک از داروهای زیر باعث افزایش حرکات دستگاه گوارش می شوند و اثر ضد تهوع دارد؟ (C آسان)

الف) سایمتیدین ب) امپرازول ج) هیوسین د) متوکلوپرامید

۵۸. کدامیک از آنتی هیستامین های زیر خواب آوری کمتری دارند؟ (B متوسط)

الف) پرومتازین ب) ستیریزین ج) سیپروهیتادین د) لوراتادین

۵۹. کلیدینیوم سی حاوی چه ترکیباتی است و هر کدام از کدام دسته دارو هستند؟ (A سخت)

الف) کلیدینیوم (گوارشی) کلسیم (املاح معدنی)

- (ب) کلیدینیوم (قلبی) کالامین (آنتی هیستامین)
 (ج) کلیدینیوم (ضد چربی) کلردیازپوکساید (آرامبخش)
 (د) کلیدینیوم (گوارشی) کلردیازپوکساید (آرامبخش)

۶۰. فردی با پنی سیلین دچار شوک آنافیلاکسی شده است کدام یک از داروهای زیر را می تواند استفاده کند؟
 B متوسط)

- ceftriaxion (الف) imipenem (ب) erythromycin (ج) ceftazidime (د)

۶۱. مناسب ترین محل برای تزریق عضلانی بر روی ناحیه باسن (گلوئتال) کدام ناحیه آن است؟ (C آسان)
 الف) یک چهارم تحتانی خارجی
 ب) یک چهارم تحتانی داخلی
 ج) یک چهارم فوقانی خارجی
 د) یک چهارم فوقانی داخلی

۶۲. کدام مورد از نکات مشترک بین ویتامینهای محلول در چربی نمی باشد؟ (C آسان)
 الف) جذب آنها نیازمند وجود نمکهای صفراوی می باشد
 ب) مصرف طولانی مدت آنها ممکن است عوارض جانبی آنها را ظاهر نماید
 ج) متابولیسم کبدی دارند
 د) تجمع آنها در بافتهای چربی ناچیز می باشد

۶۳. از داروهای پایین آورنده قند خون: (C آسان)
 الف) گلی بنکلامید
 ب) متفورمین
 ج) پیوگلیتازون
 د) تمام موارد

۶۴. مهمترین توصیه در مورد نگهداری انسولین: (B متوسط)
 الف) همزدن ویال قبل از مصرف
 ب) نگهداری در یخچال
 ج) توجه کامل به تاریخ مصرف
 د) موارد ب و ج

۶۵. آنتوم (قرص شوید) چه خاصیتی دارد؟ (B متوسط)
 الف) پایین آورنده فشار خون
 ب) کاهنده چربی
 ج) ضدالتهاب
 د) ضد سرفه

۶۶. مهمترین عارضه جانبی داکسی سیکلین: (B متوسط)

(د) هیچکدام

(ج) اسهال

(ب) حساسیت پوستی

الف) ایجاد زخم و خونریزی مری

۶۷. از توصیه های ضروری هنگام تجویز تتراسیکلین های خوراکی؟ (A سخت)

الف) فاصله مصرف با لبنیات

ب) عدم قرار گرفتن در معرض نور آفتاب

ج) مصرف آب فراوان

د) تمام موارد

۶۸. مصرف کدام گروه از داروها در دوران بارداری کاملاً بی خطر می باشد؟ (C آسان)

(ج) D

(د) C

(ب) B

الف) A

۶۹. مهمترین عارضه پنی سیلینها چیست؟ (C آسان)

(د) هیچکدام

(ج) عوارض گوارشی

(ب) عوارض گوشه

الف) حساسیت مفرط

۷۰. اشکال دارویی رانیتیدین؟ (B متوسط)

الف) قرص ۱۰، آمپول ۱۰ و ۲۵

ج) کپسول ۱۵۰، آمپول ۱۵۰

ب) قرص ۱۵۰، آمپول ۲۵ و ۵۰

د) آمپول ۲۵، شربت 20mg/5 cc

۷۱. از عوارض اصلی داروی فیناستراید می باشد؟ (A سخت)

(د) آبریزش از بینی

ج) کاهش میل جنسی

(ب) یبوست

الف) کچلی

۷۲. اشکال دارویی آموکسی کلاو: (B متوسط)

الف) قرص ۶۲۵ و ۳۷۵

ج) سوسپانسیون ۴۵۷ و ۲۲۸

(ب) سوسپانسیون ۱۵۶ و ۳۱۲

د) تمام موارد

۷۳. مزایای آموکسی سیلین به آمپی سیلین: (A سخت)

(ب) نفوذ به بافتیهای مانند لثه و سیسئوس

الف) عوارض گوارشی کمتر

ج) داشتن طعم بهتر

د) موارد الف و ب

۷۴. کدام داروی NSAIDs عوارض گوارشی کمتری دارد؟ (B متوسط)

(ب) ایبوپروفن
(د) ایندومتاسین

(الف) سلکوکسیب
(ج) ناپروکسن

۷۵. کدام گزینه صحیح نمی باشد : (A سخت)

(الف) ترکیبات حاوی آهن رنگ مدفوع را سیاه می نمایند.
(ب) وجود ویتامین D3 برای جذب کلسیم ضروری است.
(ج) بزرگ شدن غده تیروئید را گواتر گویند.
(د) لووتیروکسین در درمان پرکاری تیروئید تجویز می شود

۷۶. مدت زمان نگهداری اشکال دارویی "پودر برای تهیه سوسپانسیون" پس از تهیه معمول چقدر است؟
(A سخت)

(ب) تا زمان انقضاء مصرف دارو
(د) یک ماه در دمای اتاق

(الف) محدودیتی ندارد

(ج) تا دو هفته در یخچال

۷۷. در مورد کپسول ژلاتینی نرم (PEARL) کدام گزینه صحیح می باشد. (B متوسط)

(الف) داخل آن مایع با پایه آبی وجود دارد
(ب) سرعت انحلال آن بسیار کم است

(ج) فقط مایعات روغنی را می توان به این شکل فرموله کرد

(د) پوشش ژلاتینی آن دو قسمتی بوده و از هم جدا می شود.

۷۸. قرص Digoxin از کدام دسته داروهاست و نام تجاری آن چیست؟ (A سخت)

(ب) قلبی، لیبریوم
(د) آنتی بیوتیک، لازیکس

(الف) گوارشی، لانوکسین
(ج) قلبی، لانوکسین

۷۹. مهمترین عارضه جانبی نیتراها : (B متوسط)

(ب) عوارض گوارشی

(الف) سردرد

د) حساسیت به نور

ج) بشورات جلدی

۸۰. اشکال دارویی ویتامین ث : (C آسان)

الف) قرص ۲۵۰ ، آمپول ۵۰۰

ج) پودر ۵۰۰ ، قرص جوشان

ب) قرص جوشان، سوسپانسیون

د) موارد الف و ج

۸۱. موارد استفاده از کورتنها عبارتند از : (A سخت)

الف) آلرژی

ج) جلوگیری از پس زدن عضو پیوندی

ب) التهاب و تورم

د) تمام موارد

۸۲. کدام دارو به عنوان قرص مسافرت یا ماشین گرفتگی معروف است : (B متوسط)

الف) بتاهیستین

ج) دیمن هیدرینات

ب) ستیریزین

د) لوراتادین

۸۳. D/S و D/W به ترتیب برای کدام سرم ها بکار می روند : (A سخت)

الف) سرم قندی نمکی، قندی

ج) به سرم ها مربوط نمی شوند

ب) آب مقطر، قندی نمکی

د) رینگر، قندی

۸۴. اشکال دارویی سولفاستامید : (C آسان)

الف- قطره چشمی ۵ و ۲۵ درصد

ج- قطره چشمی ۱۰ و ۲۰ درصد

ب- قطره چشمی پردنیزولون اس

د- مورد ب و ج

۸۵. چرا توصیه می شود در طول در مان با کوتریموکسا زول، مصرف مایعات افزایش یابد؟ (B متوسط)

الف- جلوگیری از تشنگی

ج- افزایش ادرار و عدم رسوب دارو در کلیه

ب- جلوگیری از ماندن دارو در مری

د- جلوگیری از عوارض گوارشی

۸۶. اشکال دارویی جنتامایسین: (B متوسط)

الف - شربت و قرص

ج- آمپول

ب- قطره و پماد چشمی

د- موارد ب و ج

۸۷. Librium و librax به ترتیب نام تجاری کدام داروها می باشند . (A سخت)

- الف- کلرودیازپوکساید - دیازپام
ب- دیازپام - لورازپام
ج- آلپرازولام-کلیدینیوم سی
د- کلرودیازپوکساید - کلیدینیوم سی

۸۸. اشکال دارویی اریترومایسین: (B متوسط)

- الف- قرص ۲۰۰ و ۴۰۰
ب- سوسپانسیون
ج- پماد چشمی
د- تمام موارد

۸۹. کدام دارو ضد تشنج می باشد : (A سخت)

- الف- کاربامازپین
ب- کلرودیازپوکساید
ج- ایمی پرامین
د- الپرازولام

۹۰. کدام دارو در درمان ریزش مو در آقایان استفاده می شود : (A سخت)

- الف - تاموکسیفن
ب- تستوسترون
ج- فیناستراید
د- کلومیفن

۹۱. ترکیبات موجود در کوتریموکسازول عبارتند از : (A سخت)

- الف - سولفاسالازین و متوکلوپرامید
ب- سولفامتوکسازول و تری متوپریم
ج - تریپل سولفا و سولفاستامید
د- سولفامتوکسازول و متوکلوپرامید

۹۲. اشکال دارویی جنتامایسین: (C آسان)

- الف - شربت و قرص
ب- قطره و پماد چشمی
ج- آمپول
د- موارد ب و ج

۹۳. اشکال دارویی اریترومایسین: (A سخت)

- الف- قرص ۲۰۰ و ۴۰۰
ب- سوسپانسیون
ج- پماد چشمی
د- تمام موارد

۹۴. کدام دارو ضد تشنج می باشد : (B متوسط)

الف- کاربامازپین

ب- کلردیاز پوکساید

ج- ایمی پرامین

د- الپرازولام

۹۵. کدام دارو در درمان ریزش مو در آقایان استفاده می شود : (A سخت)

الف - تاموکسیفن

ب- تستوسترون

ج- فیناستراید

د- کلومیفن

۹۶. ترکیبات موجود در کوتریموکسازول عبارتند از : (A سخت)

الف - سولفاسالازین و متوکلوپرامید

ب- سولفامتوکسازول و تری متوپریم

ج - تریپل سولفا و سولفاستامید

د- سولفامتوکسازول و متوکلوپرامید

۹۷. بهترین زمان مصرف Alms چه زمانی است؟ (B متوسط)

الف- نیم ساعت قبل از غذا

ب- یک ساعت بعد از غذا

ج- صبح ناشتا

د- شب قبل از خواب

۹۸. کدام دارو قطره چشمی ندارد؟ (C آسان)

الف- بتا متازن

ب- تترا کائین

ج- هیدروکورتیزون

د- جنتامایسین

۹۹. موارد Tid و qd به چه معنایی است؟ (A سخت)

الف- عضلانی، روزی سه بار

ب- روزی یکبار، روزی سه بار

ج- روزی چهار بار، روزی سه بار

د- روزی یکبار، روزی چهار بار

۱۰۰. IM ، Nasal ، Ophthalmic به ترتیب عبارتند از : (A سخت)

الف- چشمی، گوشه، عضلانی

ب- تنفسی، بینی، وریدی

ج- چشمی، بینی، عضلانی

د- چشمی، بینی، وریدی

۱۰۱. مهمترین نکته در مصرف آنتی بیوتیکها: (B متوسط)

ب- عدم مصرف خود سرانه

د- تمام موارد

الف- تکمیل دوره درمان

ج- رعایت زمان مصرف دارو

۱۰۲. کدام دارو دیورتیک (Diuretic) نمی باشد: (A سخت)

ب- فوروزماید

د- اسپرونولاکتون

الف- ایزوسورباید

ج- تریامترن اچ

۱۰۳. کدام داروی ضد صرع نمی باشد؟ (C آسان)

ب- کاربامازپین

د- آمی تریپتیلین

الف- فنوباریتال

ج- والپروات سدیم

۱۰۴. کدامیک از اقدامات زیر را در فردی که دچار اختلالات تنفسی می باشد نباید انجام داد؟ (B متوسط)

الف- شل کردن یقه لباس

ب- کنترل راه هوایی مصدوم

ج- کمک به استفاده بیمار از داروهایی که مرتباً برای مشکل تنفس خود استفاده می کند

د- دادن مایعات فراوان به بیمار

۱۰۵. مهمترین خطراتی که اطفال را تهدید می کند شامل کدام مورد زیر می

باشد؟ (C آسان)

ب- سقوط از بلندی

د- همه موارد

الف- مسمومیت ها

ج- غرق شدگی

۱۰۶. بهترین اقدامات در فردی که دچار سانحه آسیبهای نخاعی گردیده چه می

باشد؟ (B متوسط)

ب- ثابت نگه داشتن مصدوم در مقابل هر نوع حرکتی

د- مورد ب و ج

الف- تغییر وضعیت سریع بیمار

ج- بی حرکتی گردن و کنترل موارد abc

۱۰۷. مهمترین نشانه سوختگی درجه سه چیست؟ (B متوسط)

- الف- پوست قرمز و روشن
ب- درد شدید در نواحی سوختگی
ج- عدم وجود درد در نواحی سوختگی
د- ترشح مایع بافتی از نواحی تاولها

۱۰۸. بهترین تعریف برای دیابت کدام است؟ (C آسان)

- الف- داشتن علائم پرنوش، پر ادراری و کاهش
ب- قند خون اتفاقی بیشتر از ۲۰۰
ج- قند خون ناشتا بیشتر از ۱۲۶
د- همه موارد

۱۰۹. دیررس ترین علامت کاهش اکسیژن در بدن کدام است؟ (B متوسط)

- الف- تنگی نفس
ب- افزایش ضربان قلب
ج- بی قراری
د- کبود شدن

۱۱۰. میزان زمان چک تنفس بیمار در CPR به چه صورت است؟ (B متوسط)

- الف- ۱۰ ثانیه
ب- ۲۰ ثانیه
ج- ۵ ثانیه
د- ۱ دقیقه

سوال	الف	ب	ج	د	سوال	الف	ب	ج	د
١	B				21				C
٢	A				22		A		
٣	C				23	B			
٤			B		24			A	
٥			C		25		C		
٦	A				26				B
٧		B			27	A			
٨		A			28	A			
٩		A			29			B	
١٠	B				30			A	
١١				B	31		B		
١٢		A			32			A	
١٣			A		33	A			
١٤				C	34				C
١٥			B		35	A			
١٦		B			36				B
١٧		A			37				A
١٨				A	38				C
١٩				A	39			B	
٢٠	B				40		A		

سوال	الف	ب	ج	د	سوال	الف	ب	ج	د
٤١		B			٦١			C	
٤٢	C				٦٢				C
٤٣				A	٦٣				C
٤٤	C				٦٤				B
٤٥			B		٦٥		B		
٤٦			A		٦٦	B			
٤٧				A	٦٧				A
٤٨			B		٦٨	C			
٤٩				C	٦٩	C			
٥٠			A		٧٠		B		
٥١	B				٧١			A	
٥٢	A				٧٢				B
٥٣				B	٧٣				A
٥٤				A	٧٤	B			
٥٥	B				٧٥				A
٥٦		C			٧٦			A	
٥٧				C	٧٧			B	
٥٨		B			٧٨			A	
٥٩				A	٧٩	B			
٦٠			B		٨٠				C

سوال	الف	ب	ج	د	سوال	الف	ب	ج	د
٨١				A	١٠١				B
٨٢			B		١٠٢	A			
٨٣	A				١٠٣				C
٨٤				C	١٠٤				B
٨٥			B		١٠٥				C
٨٦				B	١٠٦				B
٨٧				A	١٠٧				B
٨٨				B	١٠٨				C
٨٩	A				١٠٩				B
٩٠			A		١١٠	B			
٩١		A			١١١				
٩٢				C	١١٢				
٩٣				A	١١٣				
٩٤	B				١١٤				
٩٥			A		١١٥				
٩٦		A			١١٦				
٩٧		B			١١٧				
٩٨			C		١١٨				
٩٩		A			١١٩				
١٠٠			A		١٢٠				